

**Wielu rodziców zastanawia się, kiedy udać się z dzieckiem do logopedy. Najlepiej zrobić to wtedy, kiedy pojawia się pierwszy niepokój i niepewność co do tego, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo.**

**Do logopedy należy udać się kiedy:**

1. Czujesz niepokój i zauważyłaś, że mowa Twojego dziecka opóźnia się lub występują inne niepokojące objawy. Pamiętaj o tym, że im szybciej rozwiejesz swoje wątpliwości u specjalisty, tym zwiększasz szanse na szybsze rozwiązanie problemu.
2. Profilaktycznie, aby sprawdzić czy rozwój mowy przebiega prawidłowo i dowiedzieć się, jak można ten rozwój wspierać

**Objawy, z którymi trzeba udać się do specjalisty:**

- brak gaworzenia lub jego opóźnienie (norma między 6 a 7 miesiącem)
- dziecko między 6 a 7 miesiącem nie reaguje na odgłosy, dźwięki, nie odwraca się w kierunku dźwięku
- dziecko w wieku 12 miesięcy nie kojarzy pierwszych słów oraz dźwięków z osobą lub rzeczą
- nie pojawiają się pierwsze słowa pod koniec okresu melodii (około 1 roku życia)
- mowa rozwija się bardzo wolno i znacznie się opóźnia w porównaniu do rówieśników
- dziecko zacina się
- mało mówi lub nie mówi wcale
- pomimo kilku lat dziecko jest niezrozumiałe dla otoczenia, mówi bełkotliwie i niewyraźnie
- nie dąży do kontaktu z ludźmi
- w wieku 5 lat nie pojawia się głoska „sz”, „ż”, „cz”, „dż”
- pod koniec 5 roku życia nie pojawia się głoska „r”
- głoski są zniekształcone (np. deformacje międzyzębowe)
- konsekwentnie zamienia dane głoski na inne
- ma wygórowany odruch wymiotny
- ma problemy z odgryzaniem, żuciem oraz połykaniem różnorodnych pokarmów
- wykazuje dużą nadwrażliwość jamy ustnej (nie lubi mycia zębów, dotykania obrębu warg, wizyt u dentysty z powodu nadwrażliwości)

- ma skrócone wędzidełko podjęzykowe lub wydaje Ci się, że może mieć nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny
- nie słyszy dźwięków
- ma przewlekłe infekcje uszu
- nawykowo oddycha przez usta
- chrapie
- bardzo mocno się ślini (nie dotyczy zębujących dzieci)
- podejrzewamy wadę zgryzu
- głos jest słaby, zachrypnięty lub o zabarwieniu nosowym
- nagle przestaje mówić (np. w konkretnych sytuacjach)
- dziecko ma obniżone lub zwiększone napięcie mięśni twarzy i narządów mowy.

Dominika Miturska logopeda

